

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

ПОСТЕРИЗАН®

Регистрационный номер: П N012331/01

Торговое наименование: Постеризан®

Международное непатентованное или группировочное наименование: ~

Лекарственная форма: мазь для ректального и наружного применения

Состав:

в 1,0 г мази содержится:

Действующее вещество: Стандартизованная суспензия культуры бактерий *E. coli* (3,30 x 10⁸ инактивированных микробных клеток) 166,7 мг;

Вспомогательные вещества: фенол (сжиженный)* 3,30** мг, ланолин 166,6 мг, вазелин 666,7 мг.

*в составе стандартизованной суспензии культуры бактерий *E. coli*

**соответствует содержанию твердого фенола 3,0 мг

Описание

Однородная мазь от белого до бежевого цвета с характерным запахом фенола.

Фармакотерапевтическая группа: противогеморроидальные препараты для местного применения.

Код АТХ: C05AX

Фармакологические свойства

Антигены клеточных стенок и продукты метаболизма кишечной палочки при контакте со слизистой прямой кишки и кожей аногенитальной области повышают местную резистентность тканей к воздействию патогенной микрофлоры. Препарат стимулирует Т-лимфоцитарную систему клеточного иммунитета, увеличивает фагоцитарную активность лейкоцитов и клеток ретикулоэндотелиальной системы, неспецифические факторы иммунитета, уменьшает экссудацию сосудов при воспалении, нормализует проницаемость и тонус кровеносных сосудов, стимулирует регенерацию поврежденных тканей.

Показания к применению

Постеризан мазь назначают взрослым при следующих заболеваниях:

- анальный зуд, выделения и жжение в анальной области вследствие геморроидальных заболеваний;
- анальные трещины;
- экземы.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к фенолу.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Может без риска применяться во время беременности и в период кормления грудью.

Способ применения и дозы

Мазь наносится тонким слоем на пораженный участок кожи и слизистой оболочки утром и вечером, а также после каждой дефекации. Для более глубокого введения мази в прямую кишку можно использовать навинчивающийся аппликатор, прилагаемый к упаковке.

Возможно комбинированное использование Постеризан® мази и Постеризан® суппозитория ректальных.

Курс лечения составляет 2-3 недели.

Побочное действие

Постеризан® не обладает побочными явлениями даже при длительном применении. В качестве консерванта в препарате используется фенол, поэтому возможны аллергические реакции у пациентов с повышенной чувствительностью к этому компоненту, при развитии которых применение препарата следует прекратить.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не выявлены.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Постеризан® не влияет на способность к вождению автотранспорта и выполнению работ, требующих повышенной скорости психомоторных реакций.

Форма выпуска

Мазь для ректального и наружного применения.

По 25 г мази в алюминиевую тубу (возможно наличие защитной алюминиевой мембраны

для контроля первого вскрытия) с навинчивающейся полиэтиленовой крышкой. По 1 тубе вместе с аппликатором в индивидуальной упаковке и инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Транспортирование

При температуре от 0 °С до 25 °С.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке!

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель

Др. Каде Фармацевтическая Фабрика ГмбХ,

Германия, 12277 Берлин, Ригиштрассе, 2

Тел. +49 30 7208 2 0

Факс +49 30 7208 2 200

Организация, принимающая претензии

ООО «Ацино Рус»

129110, Москва, проспект Олимпийский,

дом 16, строение 5, этаж 5, помещение I

Телефон: +7 (495) 502-92-47

Е-Mail: info_rus@acino.swiss,

safety_rus@acino.swiss