

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Постеризан® форте

Регистрационный номер: П N014065/01

Торговое наименование: Постеризан® форте

Международное непатентованное или группировочное наименование: ~

Лекарственная форма: мазь для ректального и наружного применения

Состав

в 1 г мази содержится:

Действующие вещества: стандартизованная суспензия культуры бактерий *E. coli* (5,00 x 10⁸ инактивированных микробных клеток) – 166,70 мг, гидрокортизон 2,50 мг;

Вспомогательные вещества: фенол (сжиженный)* 3,30** мг, ланолин 166,20 мг, вазелин 664,60 мг.

* в составе стандартизованной суспензии культуры бактерий *E. coli*

** соответствует содержанию твердого фенола 3,0 мг

Описание

Однородная мазь от белого до бежевого цвета с характерным запахом фенола.

Фармакотерапевтическая группа: препараты для лечения геморроя и анальных трещин в комбинации

Код АТХ: C05AX03

Фармакологические свойства

Биологические свойства

Антигены клеточных стенок и продукты метаболизма кишечной палочки при контакте со слизистой прямой кишки и кожей аногенитальной области повышают местную резистентность тканей к воздействию патогенной микрофлоры. Препарат стимулирует Т-систему иммунитета, фагоцитарную активность лейкоцитов и клеток ретикулоэндотелиальной системы, неспецифические факторы иммунитета, уменьшает экссудацию при воспалении, нормализует проницаемость и тонус кровеносных сосудов, стимулирует регенерацию поврежденных тканей.

Гидрокортизон при местном применении обладает противовоспалительным и антиаллергическим действием. При нанесении на пораженную поверхность уменьшает отек, гиперемиию, зуд.

Показания к применению

Назначают взрослым при следующих заболеваниях:

- упорное течение геморроя;
- перианальный дерматит;
- анальный зуд, особенно устойчивый к другим лекарственным средствам;
- анопапиллит;
- анальная трещина.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к гидрокортизону или другим компонентам препарата.

Бактериальные заболевания в области лечения (например, туберкулез, сифилис, гонорея).

Грибковые заболевания в области лечения.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Нет указаний на то, что гидрокортизон из мази Постеризан®форте попадает в плаценту или в материнское молоко. До настоящего времени не обнаружено никаких сведений, указывающих на повреждающее действие препарата на плод.

Вместе с тем, Постеризан®форте, как и все медикаменты, должны применяться при беременности и в период лактации только при строгом контроле врача.

Способ применения и дозы

Мазь наносят тонким слоем на пораженный участок кожи и слизистой оболочки утром и вечером, а также после каждой дефекации. Для более глубокого введения мази в анальный канал можно использовать навинчивающийся аппликатор, прилагаемый к комплекту.

Возможно комбинированное использование мази и суппозиторий Постеризан®форте.

Курс лечения продолжается 2-3 недели.

Побочное действие

В качестве консерванта в препарате используется фенол, поэтому возможны аллергические реакции у пациентов с повышенной чувствительностью к этому компоненту.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

При одновременном применении мази Постеризан®форте и других препаратов с глюкокортикоидами (таблетки, капли или инъекции) могут усиливаться действия или побочные действия.

Пожалуйста, обратите внимание, что эти указания могут распространяться также и на лекарственные средства, применяемые недавно.

Форма выпуска

Мазь для ректального и наружного применения.

По 25 г мази в алюминиевую тубу (возможно наличие защитной алюминиевой мембраны для контроля первого вскрытия) с навинчивающейся полиэтиленовой крышкой. По 1 тубе вместе с аппликатором в индивидуальной упаковке и инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке!

Условия отпуска

Без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

Др. Каде Фармацевтическая Фабрика ГмбХ,

Германия, 12277 Берлин, Ригиштрассе, 2

Тел. +49 30 7208 2 0

Факс +49 30 7208 2 200

Производитель

Др. Каде Фармацевтическая Фабрика ГмбХ,

Германия, 12277 Берлин, Ригиштрассе, 2

Тел. +49 30 7208 2 0

Факс +49 30 7208 2 200

Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Ацино Рус»

129110, Москва, проспект Олимпийский, дом 16, строение 5, этаж 5, помещение I

Телефон: +7 (495) 502-92-47

Е-Mail: info_rus@acino.swiss,

safety_rus@acino.swiss