

Листок-вкладыш – информация для пациента**Постеризан® , суппозитории ректальные**

Действующее вещество: стандартизованная суспензия культуры бактерий *E. coli*.

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

- Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.
- Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.
- Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.
- Если состояние не улучшается или оно ухудшается в течение 14 дней, Вам следует обратиться к лечащему врачу.

Содержание листка-вкладыша

1. Что из себя представляет препарат Постеризан®, и для чего его принимают.
2. О чем следует знать перед приемом препарата Постеризан®.
3. Прием препарата Постеризан®.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Постеризан®.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат Постеризан®, и для чего его применяют

Препарат Постеризан® - суппозитории ректальные, содержащие действующее вещество: стандартизованная суспензия культуры бактерий *E. coli*.

Препарат Постеризан® за счет активации иммунных механизмов, снижает воспаление и способствует заживлению тканей. Это помогает облегчить зуд и жжение, вызванные

геморроидальной болезнью.

Показания к применению

Постеризан суппозитории ректальные назначают взрослым (с 18 лет) при следующих заболеваниях: анальный зуд, выделения и жжение в анальной области вследствие геморроидальных заболеваний.

Способ действия препарата

При местном применении на коже анальной области и слизистой прямой кишки, компоненты препарата запускают местный иммунный ответ. Воздействие препарата на иммунные клетки в подслизистом слое приводит к высвобождению противовоспалительных сигнальных молекул, благодаря работе которых разивается противовоспалительный и противозудный эффект, так же уменьшается отек, нормализуется проницаемость и тонус кровеносных сосудов.

Кроме того, препарат стимулирует регенерацию поврежденных тканей. Ускоренное заживление слизистой прямой кишки способствует уменьшению кровоточивости и болевого симптомов.

Многочисленное введение препарата стимулирует развитие лимфоцитов (иммунных клеток) в лимфатических узлах и выработку антител, что усиливает защиту от инфекционных осложнений геморроидальной болезни.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед применением препарата Постеризан®

Противопоказания

Не применяйте препарат Постеризан®, если:

Гиперчувствительность к действующему веществу или другим компонентам препарата, детский возраст до 18 лет.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата Постеризан® проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Содержит макрогола глицерилгидроксистеарат. Может вызывать кожные реакции.

Дети и подростки

Препарата Постеризан® противопоказан детям до 18 лет.

Другие препараты и препарат Постеризан®

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Беременность, грудное вскармливание и фертильность

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Препарат Постеризан® не оказывает влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами.

3. Применение препарата Постеризан®

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Применение у детей

Противопоказано детям младше 18 лет.

Путь и (или) способ введения

Вводят в анальный проход по одному суппозиторию утром и вечером по возможности после дефекации. Рекомендуемая суточная доза - 2 суппозитория. Возможно комбинированное использование Постеризан® суппозиторияев ректальных и Постеризан® мази для ректального и наружного применения.

Продолжительность терапии

Курс лечения составляет 2-3 недели.

Если Вы приняли препарата Постеризан® больше, чем следовало

О случаях передозировки не сообщалось.

При случайном проглатывании (у детей) могут возникнуть желудочно-кишечные симптомы (боль в животе, тошнота).

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат Постеризан® может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.

Общие расстройства и нарушения в месте введения

Местные реакции гиперчувствительности, например, зуд и жжение (часто - могут встречаться не более чем 1 человека из 10).

Аллергический контактный дерматит вследствие повышенной чувствительности к консерванту фенолу (не часто - могут встречаться не более чем у 1 человека из 100).

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникают какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленных на территории государств – членов Евразийского экономического союза.

Российская Федерация

109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Телефон горячей линии: 8 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

<https://roszdravnadzor.gov.ru/>

Республика Беларусь

220037, г. Минск, Товарищеский пер., 2а

РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефон: +375 17 242 00 29

Электронная почта: rcpl@rceth.by

<https://www.rceth.by>

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете собрать больше сведений о безопасности препарата.

5. Хранение препарата Постеризан®

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на тубе и пачке после слов «Годен до:».

Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните препарат при температуре не выше 25 °С.

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которые больше не потребуются. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат Постеризан® содержит

1 суппозиторий содержит

Действующее вещество: стандартизованная суспензия культуры бактерий *E. coli* (6,60 x 10⁸ инактивированных микробных клеток) 387,10 мг;

Вспомогательные вещества: фенол (сжиженный)*, макрогола глицерилгидроксистеарат, жир твердый.

*в составе стандартизованной суспензии культуры бактерий *E. coli*

Внешний вид препарата Постеризан® и содержимое упаковки

Суппозитории ректальные.

Торпедовидные суппозитории от белого до бежевого цвета с характерным запахом фенола.

На продольном срезе – однородные, не содержащие посторонних вкраплений, допускается наличие воздушного стержня или воронкообразного углубления.

По 5 суппозитория в стрип из алюминиевой фольги с ПУ/ПЭ покрытием. По 2 стрипа вместе с листком-вкладышем в картонную пачку.

Держатель регистрационного удостоверения:

Др. Каде Фармацевтическая Фабрика ГмбХ, Германия

Производитель:

Др. Каде Фармацевтическая Фабрика ГмбХ,

Германия, 12277 Берлин, Ригиштрассе, 2

Тел. +49 30 7208 2 0

Факс +49 30 7208 2 200

За любой информацией о препарате следует обращаться к локальному представителю держателя регистрационного удостоверения:

На территории Российской Федерации:

ООО «Алцея»

129110, Москва, проспект Олимпийский,
дом 16, строение 5, этаж 5, помещение I

Телефон: +7 (495) 502-92-47

Е-Mail: safety@alceapharma.ru

На территории Республики Беларусь:

ЗАО «Юнифарм» Ивана Козырева

223060, г. Минск, Большое Кольцевое шоссе, 40-1, офис 36, Беларусь

Телефон: +375-17-3940106

Е-Mail: info@unifarm.by

referent@unifarm.by

Листок-вкладыш пересмотрен

Прочие источники информации

Подробные сведения о лекарственном препарате содержатся на веб-сайте Союза:

<https://ees.eaeunion.org>